

Aktuelle Hinweise zum Haselnussanbau

Haselnussbohrer

Bilder Dr. Rapp



Der Käfer kommt im Mai aus dem Boden und macht seinen Reifungsfrass. Dieser dauert etwa 3-4 Wochen. Er frisst etwa 1-2mm grosse runde Löcher in das Blatt. Diese sind kaum zu erkennen, da andere Raupen auch tätig sind. Danach kopuliert der Käfer und legt seine Eier ab. In jede Nuss ein Ei.

Der Spritztermin dürfte jetzt **Anfang Juni gegeben sein**, wenn die ölhaltigen Kerne in den Nüssen zu wachsen beginnen.

Zur Bekämpfung stehen derzeit . Karate mit Zeon Technologie 75ml/ha (Anwendung max 1x pro Jahr) bzw. Calypso 200ml/ha (Anwendung max 2x pro Jahr) zur Verfügung. Eine Wiederholung der Spritzung in 10- 14 Tagen ist anzuraten.

Blattdüngung mit Bor

Um den Fruchtansatz für Ertragsanlagen zu erhöhen ist weiterhin in TM eine Blattdüngung mit Bor anzuraten. Zur Verfügung steht z.B. das **Folicin Bor plus flüssig max.3l/ha (max.0,5%ig)**, das eine sehr verträgliche Form der Bordüngung ist. Zudem enthält der Blattdünger weitere Spurenelemente. Der Einsatz mit **Solubor soll auf max.2kg/ha** begrenzt werden. Zu hohe Dosierungen können auch zu Schäden führen.

Rindenbrand (Pseudomonas)

Aufgrund der Witterung möchte ich auf die **bewährte Maßnahme** zur Vorbeugung von Pseudomonas mit Protamin Cu 30 in Kombination mit Phosfik hinweisen. Siehe dazu den Hinweis vom 25.03.2010

